

## Fohlenmilch

### *... Milchaustauschfuttermittel für Fohlen*

Infolge Milchmangel, Erkrankung oder Tod der Stute ist es manchmal notwendig, ein Fohlen mit einem Stutenmilchersatz aufzuziehen.

In den ersten Lebensstunden nach der Geburt geben Sie dem Fohlen 40 ml Josera Erbavit flüssig zur ersten Vitaminversorgung.

Zusätzlich sollte das Fohlen frühzeitig am ersten Tag 6 x 150 ml Fremdkolostrum zum Immunitätsaufbau erhalten. Haben Sie kein gefrorenes Kolostrum von anderen Stuten, so fragen Sie Ihren Tierarzt. Er hat eventuell ein entsprechendes Trockenpräparat. Ihr Tierarzt kann auch am 2. Tag feststellen, ob das Fohlen genügend Antikörper aus dem Kolostrum aufgenommen hat. Steht kein Kolostrum zur Verfügung, so erhält das Fohlen statt dessen von Anfang an die Josera Fohlenmilch.

#### **Tränkekonzentration für Josera Fohlenmilch:**

100 g Josera Spezial Neu und 25 g Traubenzucker pro 1 ltr. Wasser bei 42-45 °C anrühren und mit 38-40 °C verabreichen.

Beachten Sie den Tränke- und Aufzuchtplan auf der Rückseite!

Josera Spezial Neu ist durch den Zusatz von Betacarotin jetzt noch besser als Stutenmilchersatz geeignet.


Sie können das Fohlen von der Tränke absetzen, wenn es täglich mindestens 2-2,5 kg Fohlenstarter Josera Basic plus aufnimmt.

Bieten Sie neben der Josera Fohlenmilch zusätzlich ab der 3. Lebenswoche an:

- gutes blattreiches Heu
- Fohlenstarter Josera Basic plus
- frisches Wasser
- einige Male frisch abgesetzten Stutenkot zum Aufbau einer gesunden Darmflora und -fauna

Art.-Nr. 93020-J

# Tränke- und Aufzuchtplan für mutterlose Fohlen

Alter		Tränkemenge pro Mahlzeit in ltr.	Mahlzeiten pro Tag	Bemerkung
1	Tag	0,15	6	Kolostrum od. Josera Fohlenmilch
2-4	Tage	0,2	10	max. 4 Stunden Pause in der Nacht
5-7	Tage	0,5	8	
8-10	Tage	0,75	8	max. 6 Stunden Pause in der Nacht
11-14	Tage	1,0	6	
15-17	Tage	1,5	5	In der 3. Woche beginnt die Zufütterung von bestem Heu und Josera Basic plus (entsprechend den Hinweisen auf dem Sack)
18-21	Tage	2,0	4	
4	Wochen	2,25	4	
5	Wochen	3,5	3	
6-7	Wochen	4	3	
8-9	Wochen	4,5	3	
10-12	Wochen	4	3	
12-13	Wochen	3	3	
14-15	Wochen	3	3	
16	Wochen	2	2	

überreicht durch: